

주의사항 변경 항목 List

※ 적용일: 11월 18일 접수분

(정렬: 검사항목 순)

Seq.	GC Labs 코드	검사항목	변경 전	변경 후
1	D702	Clonazepam (Rivotril)	주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 용혈 검체 부적합 ③ 검체량 준수 ④ 장기 경구투여 시 3~8일 후에 항정상태에 도달 ⑤ 주민번호 기재	주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 용혈 검체 부적합 ③ 검체량 준수 ④ 장기 경구투여 시 4~6일 후에 항정상태에 도달 ⑤ 주민번호 기재
2	C695	Diazepam (Valium)	주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 용혈 검체 부적합 ③ 검체량 준수 ④ 장기 경구투여 시 3~8일 후에 항정상태에 도달 ⑤ 주민번호 기재	주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 용혈 검체 부적합 ③ 검체량 준수 ④ 장기 경구투여 시 5~10일 후에 항정상태에 도달 ⑤ 주민번호 기재
3	L899	Gabapentin	주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 장기 경구투여 시 1~2일 후에 항정상태에 도달(반감기 5~7시간) ③ Cimetidine, ketorolac은 gabapentin 제거를 감소 ④ 알루미늄, 마그네슘을 함유한 제산제는 gabapentin 흡수 감소 가능 ⑤ 주민번호 기재	주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 장기 경구투여 시 1일 후에 항정상태에 도달(반감기 5~7시간) ③ Cimetidine, ketorolac은 gabapentin 제거를 감소 ④ 알루미늄, 마그네슘을 함유한 제산제는 gabapentin 흡수 감소 가능 ⑤ 주민번호 기재
4	P616	Lacosamide	주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 장기 경구투여 시 2~3주 후에 항정상태에 도달(반감기 13시간) ③ Carbamazepine, phenytoin 등의 약제와 병용 시 lacosamide의 혈중 농도 감소 가능 ④ 주민번호 기재	주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 장기 경구투여 시 2~3일 후에 항정상태에 도달(반감기 10~15시간) ③ Carbamazepine, phenytoin 등의 약제와 병용 시 lacosamide의 혈중 농도 감소 가능 ④ 주민번호 기재
5	U506	Oxcarbazepine (Trileptal)	주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 용혈 검체 부적합 ③ 검체량 준수 ④ 장기 경구투여 시 3~8일 후에 항정상태에 도달 ⑤ 주민번호 기재	주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 용혈 검체 부적합 ③ 검체량 준수 ④ 장기 경구투여 시 2~4일 후에 항정상태에 도달 ⑤ 주민번호 기재
6	P575	Perampanel	주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 장기 경구투여 시 2~3주 후에 항정상태에 도달(반감기 105시간) ③ Carbamazepine, phenytoin, oxcarbazepine 등의 약제와 병용 시 perampanel의 혈중 농도 감소 가능 ④ 주민번호 기재	주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 장기 경구투여 시 10~22일 후에 항정상태에 도달(반감기 48~105시간) ③ Carbamazepine, phenytoin, oxcarbazepine 등의 약제와 병용 시 perampanel의 혈중 농도 감소 가능 ④ 주민번호 기재

주의사항 변경 항목 List

※ 적용일: 11월 18일 접수분

(정렬: 검사항목 순)

Seq.	GC Labs 코드	검사항목	변경 전	변경 후
7	P655	Pregabalin	주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 장기 경구투여 시 1~2일 후에 항정상태에 도달(반감기 6시간) ③ Carbamazepine, ketorolac 등의 약제와 병용시 pregabalin의 혈중 농도가 감소 가능 ④ 주민번호 기재	주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 장기 경구투여 시 1일 후에 항정상태에 도달(반감기 6시간) ③ Carbamazepine, ketorolac 등의 약제와 병용시 pregabalin의 혈중 농도가 감소 가능 ④ 주민번호 기재
8	X291	Quetiapine	주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 용혈 검체 부적합 ③ 검체량 준수 ④ 장기 경구투여 시 3~8일 후에 항정상태에 도달 ⑤ 주민번호 기재	주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 용혈 검체 부적합 ③ 검체량 준수 ④ 장기 경구투여 시 1~2일 후에 항정상태에 도달 ⑤ 주민번호 기재
9	X029	Risperidone	주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 용혈 검체 부적합 ③ 검체량 준수 ④ 장기 경구투여 시 3~8일 후에 항정상태에 도달 ⑤ 주민번호 기재	주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 용혈 검체 부적합 ③ 검체량 준수 ④ 장기 경구투여 시 1일 후에 항정상태에 도달 (metabolites 4~5일) ⑤ 주민번호 기재
10	B866	Topiramate	주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 용혈 검체 부적합 ③ 검체량 준수 ④ 장기 경구투여 시 3~8일 후에 항정상태에 도달 ⑤ 주민번호 기재	주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 용혈 검체 부적합 ③ 검체량 준수 ④ 장기 경구투여 시 4~5일 후에 항정상태에 도달 ⑤ 주민번호 기재
11	D705	Zonisamide (Excegran)	주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 용혈 검체 부적합 ③ 검체량 준수 ④ 장기 경구투여 시 3~8일 후에 항정상태에 도달 ⑤ 주민번호 기재	주의사항: ① 안정상태에서 약물투여 직전에 채혈 ② 용혈 검체 부적합 ③ 검체량 준수 ④ 장기 경구투여 시 10~16일 후에 항정상태에 도달 ⑤ 주민번호 기재